



PROVINCIA DI VICENZA
SETTORE TURISMO AGRICOLTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"
Via Marconi n. 2- 36045 Lonigo (VI) - Tel. 0444 830088 - Fax 0444 835540
serv.fitopato@provincia.vicenza.it



BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 20 DEL 2 OTTOBRE 2014

METEO VENETO a cura dell'A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)

Giovedì: Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento sensibile rispetto a mercoledì e un po' sopra la media.

Venerdì: Cielo: In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Sulla pianura tra Basso Veronese, Basso Vicentino, Basso Padovano e Rodigino occidentale alcune foschie e qualche nebbia di notte e al primo mattino; anche in Val Belluna ristagno di umidità nella prima parte di giornata, specie nelle ore più fredde. Precipitazioni: In pianura assenti; in montagna probabilità bassa (5-25%), localmente possibile qualche piovasco nel pomeriggio. Temperature: Rispetto a giovedì sulla pianura in leggero calo, nelle valli in lieve aumento di notte e in moderato calo di giorno, in alta montagna senza variazioni di rilievo.

Sabato: Cielo: In pianura cielo poco nuvoloso, sulle Prealpi varia nuvolosità nelle ore più fredde e parziali schiarite nelle ore centrali, sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio; tra Veronese, Vicentino, Padovano e Rodigino alcune foschie e qualche nebbia di notte e al primo mattino. Precipitazioni: Assenti in pianura. In montagna probabilità bassa (5-25%); localmente possibile qualche pioviggine sulle Prealpi e qualche piovasco nel pomeriggio sulle Dolomiti. Temperature: Rispetto a venerdì sulla pianura saranno in leggero calo, nelle valli senza notevoli di rilievo di notte e in leggero calo di giorno, in alta montagna in aumento di notte e in moderato calo di giorno.

Domenica: In pianura non si verificheranno precipitazioni, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, ci saranno alcune riduzioni della visibilità di notte e al primo mattino. In montagna parzialmente nuvoloso o nuvoloso nelle valli e poco o parzialmente nuvoloso ad alta quota, con possibilità di qualche breve pioggia. Le temperature rispetto a sabato scenderanno un po' in pianura, in montagna generalmente in aumento di notte e in calo di giorno.

Andamento meteo-climatico: La settimana è trascorsa all'insegna del bel tempo con temperature massime e minime comprese nella norma del periodo. Solo nella giornata di mercoledì u.s. si è verificata una precipitazione, peraltro di scarsa entità (2-6 mm), su tutto il territorio provinciale.

Fase fenologica: le varietà Leccino e Pendolino hanno raggiunto la fase di completa invaiatura in tutti i comprensori olivicoli, mentre le varietà più tardive (Rasara e Frantoio) la stanno per iniziare. La fase di inolizione sta procedendo lentamente. Nella penultima settimana di settembre infatti la resa media in olio rilevata su alcuni campioni di varietà precoci ha fatto segnare un 11-12% nella pedemontana e un 14-15% nei Berici così come il periodo precedente.

Situazione fitosanitaria: Negli appezzamenti correttamente trattati, le catture di Mosca sono in flessione (10 individui per trappola al massimo) e le olive non evidenziano nuove presenze di uova o larve attive. Situazione diversa negli altri casi con catture in aumento talvolta anche significativo (90 individui/trappola in

appezzamenti dove è stato eseguito solo il primo intervento con larvicidi!). Inoltre gran parte delle drupe evidenzia tutti gli stadi evolutivi dell'insetto (uova, larve e pupe) segno evidente dell'accavallamento delle generazioni. **La diffusione e l'intensità della presenza di questo parassita nel 2014 è stata assolutamente eccezionale! Certamente verrà ricordata a lungo la sua nocività, ben superiore anche a quella del 2007, che ha già causato in diverse situazioni mal gestite delle perdite quantitative di prodotto realmente molto alte.**

Difesa: Per tutti i comprensori vicentini, laddove il terzo trattamento con prodotti larvicidi a base di Dimetoato, Fosmet o Imidacloprid è stato eseguito come indicato tre settimane fa, è opportuno eseguire un nuovo intervento nei prossimi giorni impiegando un formulato a base di esche avvelenate con spinosad (Spintor Fly). Questa indicazione è altrettanto valida per coloro che già adottano questo metodo di difesa i quali tuttavia devono badare a rispettare il numero massimo di trattamenti stagionali consentiti (8 applicazioni/anno).

Con il presente bollettino si conclude la campagna di informazione fitosanitaria dedicata alla coltura dell'olivo. Rivolgiamo a tutti coloro che ci hanno seguito in questi mesi gli auspici per una soddisfacente conclusione della stagione produttiva.