

N°: 04 <<Inviato il 10 Maggio 2018>> ANNO XXII
Ufficio postale di: FONZASO
Egr. Sig.
SINDACO E ASS. AGRICOLTURA
C/O MUNICIPIO
32030 FONZASO**Bollettino n. 3-12/18 di Fiorello Terzariol Inviato il 10.05.2018****DIFESA DELLA VITE: INIZIO UTILIZZO FUNGICIDI ENDOTERAPICI**

La prima decade di maggio è stata caratterizzata da un andamento con elevata variabilità meteorologica.

La vite ha continuato ad evidenziare un importante accrescimento vegetativo, con grappoli che presentano ora bottoni fiorali separati.

Attualmente sono ancora piuttosto marginali le segnalazioni sui riscontri della forma primaria della Peronospora. L'attenzione dovrà d'ora in poi essere sempre più alta, per il motivo che si sono compiute, o si stanno compiendo in questi giorni, le possibili infezioni nate con le piogge della prima settimana di maggio.

Dopo l'ultimo trattamento contro la **Peronospora** consigliato con prodotti di Contatto/Superficie, i prossimi interventi potranno essere effettuati attorno alla giornata di **lunedì 14 maggio** (attenzione alle previsioni meteo di continua piovosità...), con sostanze attive **citotropiche translaminari**, con prodotti a base di **Fluopicolide, Mandipropamide, Valifenalate, Dimetomorf, Iprovalicarb, Bentiavalicarb, Ciazofamide, Ametoctradin, Pyraclostrobin, Fenamidone, Fomoxadone** e... **Cymoxanil**.

(Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive, da sole o in combinazione, riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e nei Protocolli/Vademecum viticoli, in particolare, ma non solo, quelli che presentano frasi di pericolo H351 Folpet...e H361 Mancozeb...). Comunque, ogni viticoltore deve essere a conoscenza delle limitazioni tecnico-legislative di dove opera!

Contro l' **Oidio** si ricorda di abbinare agli antiperonosporici endoterapici, **antioidici** con pari durata di protezione, tipo **Metrafenone, Spiroxamina, Cyflufenamide, Trifloxystrobin, Fluxapyroxad**...

Per le aziende che continuano ad operare con linee di difesa **antiperonosporica** di **Superficie (Metiram, Propineb, Mancozeb Folpet, Ditianon, Rameici..)**, rimangono le attenzioni e gli accorgimenti più volte riportati: calendario di copertura attorno ai 7 giorni (seguire l'etichetta) e attenzione ai dilavamenti! In questo caso la difesa **antioidica** potrà avvalersi dell'utilizzo dello **Zolfo micronizzato**.

Per coloro che solitamente utilizzano sostanze ad attività sistemica tipo i **fosfonati** e/o il **fosetil di alluminio**, si consiglia di intervenire in questa fase di elevata attività fisiologica e accrescimento vegetativo, abbinando tali sostanze ai prodotti di superficie sopra indicati (attenzione alla fitotossicità che possono provocare miscele estemporanee "fatte in casa" tra il fosetil/fosfonati e il rame!).