

Rilievo Olivo 03 settembre 2015

Situazione generale del Vicentino:

- andamento meteo settimanale alquanto favorevole per la coltura con buona ventilazione, bassa umidità e temp. medie a cavallo dei 20°C. Non ci sono state piogge nei Berici mentre in Pedemontana, tra lunedì e martedì, sono caduti altri 20-30 mm (90-100mm a Bassano) ma senza grandine.

- fase: ingrossamento del frutto completato pressochè ovunque.

- stato vegetativo: Le ultime precipitazioni hanno dato (ovviamente) nuovo tono e vigore in tutti i comprensori.

- Mosca olivo:

Nei Berici, in generale, catture in leggera ripresa (da 0 a 7 individui/trappola, con punta di 13 in media collina a San Germano). Il campionamento delle olive (200 frutti/azienda ad altezza tra 2 e 3 metri) effettuato questa settimana presso 5 aziende in bassa, media e alta collina (su Grignan, Leccino e alcune varietà da tavola mai trattate contro la mosca finora) ha dato esito negativo (0% di infestazione attiva).

In Pedemontana catture minime con 0 - 3 individui/trappola (va ricordato che in questa zona quasi tutte le aziende hanno rispettato l'indicazione di trattamento dato due settimane fa). Infestazione attiva assente (solo da Bucco a Molvena 1%).

(continua nella pagina seguente)

- Trattamenti nei Berici:

Nell'immediato ancora nessuna necessità di intervento per coloro che intendono impiegare esclusivamente prodotti tradizionali ovicidi (dimetoato, fosmet o imidacloprid) su olive da olio. Considerato tuttavia che:

-il meteo degli ultimi quindici giorni è stato (e lo è anche attualmente) decisamente favorevole allo sviluppo dell'insetto e che perciò, potenzialmente, ci potrebbero essere dei ripopolamenti nelle ultime fasi stagionali;

-gli insetticidi suddetti hanno 28-30 gg di carenza;

è opportuno che tra la prima e la seconda settimana di settembre sia eseguito l'unico intervento cautelativo stagionale. I BIO e tutti coloro che invece NON possono/intendono impiegare i prodotti suddetti non devono abbassare la guardia e ripristinare la copertura con esche alimentari alle cadenze previste e/o dopo eventuali piogge dilavanti.

- Trattamenti nella Pedemontana:

Le indicazioni per la zona sono le stesse date per i Berici ma con un distinguo: **effettuare un secondo trattamento ovicida (Dimetoato o Fosmet o Imidacloprid) dopo il 15 di settembre**

I BIO e tutti coloro che invece NON possono/intendono impiegare i prodotti suddetti non devono abbassare la guardia e ripristinare la copertura con esche alimentari (es. Spintor Fly) alle cadenze previste e/o dopo eventuali piogge dilavanti.

I frutti continuano ad aumentare di dimensione, diverse piante hanno perso molti frutti durante la stagione probabilmente per motivi dovuti al caldo di luglio.

Ovunque è presente la cocciniglia dell'olivo, ma solo con presenze sporadiche e non preoccupanti.